

Příklad: kartičky $\bar{c} \bar{z} zt \dots$ podíváme se na náhodnou kartičku z náhodné strany. Vidíme, že je \bar{c} . Jaká je pr., že druhá strana je také \bar{c} ?

Jaké vypadá pr. prostor? $\Omega = \{ \bar{c}\bar{c}, \bar{c}z, \bar{c}t, z\bar{c}, zt, z\bar{z} \}$, P klasická

↓ zobecnění

Nastala 1 z těchto 3 možností, všechny stejně pravděpodobné ... ale jen ve 2 z nich je druhá strana \bar{c}
⇒ pr = 2/3.

Df: Podmíněná pr. jevu A za podmínky jevu B je $P(A|B) := P(A \cap B) / P(B)$.



$A \cap B$ "vyseknutý podprostor", dělení $P(B)$ srovná pravdep., aby se sečetly na 1. ^{potřebujeme $P(B) \neq 0$.}

😊 $A \perp B$ jsou nezávislé $\Leftrightarrow P(B) = 0$ nebo $P(A|B) = P(A)$.] to, jestli nastalo B, nijak neovlivní P(A).

Příklad: Hodíme kostkami X, Y. Jaká je pr., že $|X - Y| = 1$? ^{jev S - "sousedí"}

① Pokud $X \in \{1, 6\}$, pak je $P(|X - Y| = 1) = 1/6 \dots P(S|E) = 1/6$
^{jev E - "extrémní"}

② Jinak: $P(S|\bar{E}) = 2/6 = 1/3$

$$\begin{aligned} P(S \cap E) &= P(S|E) \cdot P(E) = 1/18 \\ P(S \cap \bar{E}) &= P(S|\bar{E}) \cdot P(\bar{E}) = 2/9 \end{aligned}$$

ale: $P(S \cap E) + P(S \cap \bar{E}) = P(S) = 5/18$ ^{neboť $S \cap E, S \cap \bar{E}$ je rozklad S na disj. podmnožiny}

→ vážený průměr případů, váhy jsou jejich psti.

Věta: (o úplné pravděpodobnosti, též o rozboru případů).

Nechť $A \subseteq \Omega$, $B_1, \dots, B_k \subseteq \Omega$ je rozklad Ω ($B_i \cap B_j = \emptyset$ pro $i \neq j$, $\forall B_i \neq \emptyset$, $\cup B_i = \Omega$)
t.č. $\forall B_i P(B_i) > 0$.

$$\text{Pak } P(A) = \sum_i P(A|B_i) \cdot P(B_i).$$

Příklad: Test na nemoc (nebo třeba na spam).

Jevy $N =$ "je nemocný"
 $T =$ "test vyšel pozitivně"

Z laboratoře víme:
 $P(T|N) = 0.95$ ^{Ale: 0.95}
 $P(T|\bar{N}) = 0.03$ ^{0.03}
nač $P(N) = 0.06$ ^{0.001}

falsivně pozitivní

$$\begin{aligned} P(T \cap N) &= P(T|N) \cdot P(N) = P(N|T) \cdot P(T) \\ \Rightarrow P(N|T) &= \frac{P(T|N) \cdot P(N)}{P(T)} = \frac{0.95 \cdot 0.06}{0.0852} \approx 0.67 \approx 0.0307! \end{aligned}$$

přičemž $P(T)$ spočítáme rozborem případů:

$$P(T) = P(T|N) \cdot P(N) + P(T|\bar{N}) \cdot P(\bar{N}) = 0.95 \cdot 0.06 + 0.03 \cdot 0.94 = 0.0309$$

↓ opět zobecníme

Věta (Bayesova): Pro $A \subseteq \Omega$ jevu a B_1, \dots, B_k rozklad Ω t.č. $\forall B_i P(B_i) > 0$:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_j (P(A|B_j) \cdot P(B_j))}$$

Hádanka: Hráč A napiše na 100 karet různá celá čísla,
v náhodném pořadí je ukazuje hráči B.

"problém najinými slovy" (11)

Hráč B může po lib. kartě říci STOP a vyhraje, pokud stopnul na max. číslu.
Jakou má zvolit strategii?

↳ Pokus: prohlédneme si prvích 50 a pak zastavíme na 1. větší

☞ strategie uspěje např. tehdy, je-li 2. největší v 1. polovině a největší v 2. polovině
Spočítejme, jakou to má pr.:

$$\frac{50 \cdot 50 \cdot 98!}{100!} = \frac{50 \cdot 50}{100 \cdot 99} = \frac{25}{99} = 0.\overline{25} > 1/4$$

} celkově je tedy pr. úspěchu $> 1/4$

• Jak spočítat pr. úspěchu přesně? vyjde cca 0.349

• Je dělení na 50 + zbytek optimální? pro zjednoduš. výpočet ano,
pro přesný je lepší 57 + zbytek $\rightarrow pr \approx 0.371$

Hádanka #2: Jak pomocí falešné mince simulovat pravou?

PRINCIP INKLUZE A EXKLUZE

Příklad: "Problém Sotnárky" - n páinů si uloží klobouky do šatny,
Šatnárka jim je vydá v náhodném pořadí.
Jaká je pravděpodobnost, že nikdo nedostal svůj klobouk?

↳ Pr. prostor Ω : permutace $\pi: [n] \rightarrow [n] \leftarrow$ značí se S_n

páin dostal svůj klobouk: $\pi(i) = i \leftarrow$ pevný bod permutace

My chceme $P(\{ \pi \in \Omega \mid \forall i \pi(i) \neq i \}) \leftarrow P(\text{náhodná permutace nemá pevný bod})$

↳ Uvažujme malé případy:

n=0
prázdna S_n
nemá pevný bod
 $\rightarrow P=1$

n=1
1 x
 $P=0$

n=2
12 x
21 \checkmark
 $P=1/2$

n=3
123 x
132 x
213 x
231 \checkmark
312 \checkmark
321 x
 $P = \frac{2}{6} = 1/3$


n=5
21453 } 2 rozšíření
21534 } prefixu 21
23154 } ale prefix 23
23451 } má 3 rozšíření
23514 }


• Pokus: pro $n=3$ počítáme "špatné" permutace (s pevným bodem):

1xx ... 2 } ale třeba 12x jsme započítali 2x
x2x ... 2 } \rightarrow odečteme 1x(1), 1x3(1), x23(1)
xx3 ... 2 }

-- ale 123 jsme nepočítali vůbec $\rightarrow +1$

↳ volby na jednotlivých pozicích se netriviálně ovlivňují

- To je vlastně: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 
- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$



↓ zobecníme pro n množin

Věta (Princip inkluze a exkluze) Pro koněčné množiny $A_1 - A_n$ platí:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} \sum_{I \in \binom{[n]}{j}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

[Dokážeme za chvíli ... teď zpět k šatnárce]

Alternativně:

$$\left| \bigcup_i A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

- $A_1 - A_n$: $A_i := \{ \pi \in S_n \mid \pi(i) = i \}$ ← i je pevný bod

- $A := \bigcup_i A_i$ ← mají aspoň 1 pevný bod ... zajímá nás tedy $|A|$ (přesněji řečeno $n! - |A|$)

- pro PIE potřebujeme: $|A_i| = (n-1)!$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!$$

⋮

$$\text{průnik } k \text{ množin: } (n-k)!$$

$$|A| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} (n-k)!$$

$\binom{n}{k}$ stejných členů

$$\rightarrow \sum = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot (n-k)!$$

$$|A| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{n!}{k!} = n! \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k!} \right) = n! \left(1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots \pm \frac{1}{n!} \right)$$

$$P(\pi \text{ má pevný bod}) = P(A)$$

- Nás zajímá jev opačný: $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots \pm \frac{1}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$

👁️ Pro $n \rightarrow \infty$ konverguje $P(\bar{A})$ k $\frac{1}{e}$

Důkaz PIE: Pro prvek $x \in \bigcup_i A_i$ ověříme, že jsme ho započítali právě jednou.

Nechť $k := \#A_i$, v nichž se vyskytuje x ← $\#i : x \in A_i$

Průniky k množin $\rightarrow 1_x \rightarrow$ přispěje $(-1)^{k+1}$

$j > k$ množin $\rightarrow 0_x$

$j < k$ množin $\rightarrow \binom{k}{j}$ j -tic obsahuje x → celkem přispějí $(-1)^{j+1} \binom{k}{j}$

Sečtením přes všechna j :
$$\sum_{j=1}^k (-1)^{j+1} \binom{k}{j} = - \sum_{j=1}^k (-1)^j \binom{k}{j} = 1$$

kdybychom počítali od 0, bylo by to $(1-1)^k$ podle Binom. věty. Takhle chybí $(-1)^0 \binom{k}{0} = 1 \rightarrow$ vyjde -1

to je případ $j=k$

Druhý důkaz PIE (abstraktnější)

• Zvolme $A := \cup_i A_i$... každé $X \subseteq A$ přiřadíme charakteristickou funkci

$$c_x: A \rightarrow \{0, 1\} \text{ t.j. } c_x(a) = \begin{cases} 0 & a \notin X \\ 1 & a \in X \end{cases}$$

- Vlastnosti char. funkci:
 - $c_{X \cap Y} = c_X \cdot c_Y$
 - $c_{X \cup Y} = c_{\overline{X \cap Y}} = 1 - (1 - c_X)(1 - c_Y)$
 - $c_{\overline{X}} = 1 - c_X$
 - $|X| = \sum_{a \in A} c_X(a)$

• Roznásobíme $\prod_{i=1}^n (1 + x_i) = \sum_{I \subseteq [n]} \prod_{i \in I} x_i$ dosaz. $x_i \leftarrow -x_i$
↑
proměnné → $\prod_{i=1}^n (1 - x_i) = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} \prod_{i \in I} x_i$

• Dosadíme $x_i \leftarrow c_{A_i}$: $\prod_{i=1}^n (1 - c_{A_i}) = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} \prod_{i \in I} c_{A_i}$
↑
 $c_{\overline{A_i}}$ ↑
 $c_{\cap_i A_i}$ ↑
 $c_{\cup_i A_i}$
= $1 - c_{\cup_i A_i}$
pro $I \neq \emptyset$ je to $c_{\cap_{i \in I} A_i}$
pro $I = \emptyset$ je to 1

• Upravíme: (do podoby ještě bližší PIE)
 ~~$1 - c_{\cup_i A_i} = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} c_{\cap_{i \in I} A_i}$~~

• Nakonec sečteme přes všechna $a \in A$: $|\cup_i A_i| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} |\cap_{i \in I} A_i|$... ejhle, PIE!

Příbuzná otázka: Kolik pevných bodů má průměrně náhodná permutace?

Model pro podobné otázky:

Df: Náhodná veličina na pr. prostoru je funkce $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ← třeba #1 při n hodech kostkou

• $P(X \leq 1)$ je vlastně $P(\text{jemu } \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq 1\})$

Df: Střední hodnota $E(X) := \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot X(\omega)$ ← vážený průměr (váhy = $p(\omega)$)
↖ pro nekonečnou Ω nemusí existovat

$E(X) = \sum_{a \in \mathbb{R}} P(X=a) \cdot a$ ← nekehejte se nespočetné sumy - nejvýše spočetné členy může být nenulových

! E není medián ! \rightarrow většina lidí má nadprůměrný # rukou ∞
 $E[\#rukou] < 2 \Rightarrow P(\#rukou > E(\dots)) = 1 - \epsilon$

to je m + \bar{x} . $P(X < m) \leq 1/2$
 $P(X > m) \leq 1/2$

Příklad: 2 kostky, $S =$ součet hodů: $E(S) = \sum_{a=2}^{12} P(S=a) \cdot a = \frac{1}{36} \cdot 2 + \frac{2}{36} \cdot 3 + \dots + \frac{6}{36} \cdot 7 + \frac{5}{36} \cdot 8 + \dots + \frac{1}{36} \cdot 12$

\downarrow ale jde to počítat snáz

Věta (linearita střední hodnoty): Necht' X, Y jsou náhodné veličiny a $\alpha \in \mathbb{R}$. Pak:

① $E(\alpha \cdot X) = \alpha \cdot E(X)$

② $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

} důkaz rozepsáním dle definice

$\rightarrow X =$ hodnota 1. kostky } $E(X) = E(Y) = \frac{1}{6} (1+2+\dots+6) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$
 $Y =$ hodnota 2. kostky }
 $S = X+Y \rightarrow E(S) = E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 2 \cdot \frac{7}{2} = 7$

A zpět k Satnárce: $B :=$ # černých bodů (náh. veličina)

$B_1 - B_n$, $B_i(n) := \begin{cases} 0 & \text{pokud } \pi(i) = i \\ 1 & \text{jinak} \end{cases}$ } indikátor jestli "i je černý bod"

$B = \sum_i B_i \rightarrow E(B) = E(\sum_i B_i) = \sum_i E(B_i) \leftarrow E(B_i) = P(B_i=1) = \frac{1}{n}$
 $= n \cdot \frac{1}{n} = 1.$

Ještě 1 příklad na indikátory: Posloupnost n hodů mincí ... $\Omega = \{0,1\}^n$

Chceme $E(\underbrace{\# \text{ úseků stejných hodnot}}_U)$

$U_1 - U_n \dots U_i :=$ indikátor jestli "na pozici i začíná úsek"

U_1 je vždy 1 $\rightarrow E(U_1) = 1$

jinak $U_i = \begin{cases} 0 & \text{pokud } p_i = p_{i-1} \\ 1 & \text{jinak} \end{cases} p = 1/2 \rightarrow E(U_i) = 1/2$

\uparrow i -tý hod se liší od $(i-1)$ -tého

} $E(U) = \sum_i E(U_i) = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}$